

Číslo položky	Kvalitativní znaky	Maximální srážky (-) a přírážky (+)									
		Bonitní stupně (RVB)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	Kmeny postižené v horní části korunovým nebo kmenovým zlomem										
		-15	-15	-16	-17	-18	-20	-22	-24	-25	
5	Kmeny postižené v dolní části hnilobou jádra v průměrné délce										
5.1	2 m	-11	-12	-13	-14	-15	-17	-19	-22	-26	
5.2	3 m	-14	-14	-15	-17	-19	-21	-23	-26	-30	
5.3	4 m	-19	-20	-21	-23	-24	-27	-30	-34	-38	
5.4	5 m	-28	-29	-31	-33	-35	-39	-43	-47	-52	
6	Kmeny postižené v horní části korunovým nebo kmenovým zlomem a v dolní části hnilobou jádra o průměrné délce 2 m										
		-22	-24	-27	-30	-32	-33	-34	-35	-36	
7	Mimořádně produkční a mimořádně kvalitní porosty										
7.1	Porosty s výřezy 1. jakostní třídy							+ 40			
7.2	Porosty s mimořádně vysokým produkčním potenciálem (porosty s bonitou +1)							+ 20			
8	Les nízký										
								-60			
9	Výskyt souší v porostu mimo imisní les										
								-30			
10	Porosty dřevin s významně nižší produkční schopností, nižším zpeněžením sortimentů nebo rozdílnými těžebními náklady oproti úrovni skupiny dřevin, ve které jsou zařazeny										
10.1	Habr obecný							-60			
10.2	Javor babyka, střemcha pozdní, olše zelená, jeřáb ptačí, jíva, lípa, jírovec maďal							-40			
10.3	Borovice černá, dub cer							-50			
10.4	Nepravé jádro u buku a jasanu nad 100 let							-50			
10.5	Porosty všech dřevin s velkou sukovitostí nebo křivostí kmenů							-30			
10.6	Porosty borovice kleče							-75			
11	Ostatní vlivy, např. škody způsobené střelbou, poddolování lesa, prosychání korun listnáčů, výskyt hniloby v dolní části koruny listnáčů										
								-50			