
Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost

Obsah:

Povinná vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou péči.

Obecné kontraindikace lázeňské péče.

Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé.

1. Vysvětlivky, používané zkratky, odkazy v textu.
2. Indikační skupiny:
 - I Nemoci onkologické
 - II Nemoci oběhového ústrojí
 - III Nemoci trávicího ústrojí
 - IV Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
 - V Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí
 - VI Nemoci nervové
 - VII Nemoci pohybového ústrojí
 - VIII Nemoci močového ústrojí
 - IX Duševní poruchy
 - X Nemoci kožní
 - XI Nemoci ženské

Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost

1. Přehled lázeňských léčebe s určením pro věkovou kategorii.
2. Obecná ustanovení.
3. Indikační skupiny:
 - XXI Nemoci onkologické
 - XXII Nemoci oběhového ústrojí
 - XXIII Nemoci trávicího ústrojí
 - XXIV Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
 - XXV Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí
 - XXVI Nemoci nervové
 - XXVII Nemoci pohybového ústrojí
 - XXVIII Nemoci ledvin a cest močových
 - XXIX Duševní poruchy
 - XXX Nemoci kožní
 - XXXI Nemoci gynekologické

A. Povinná vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou péči

Druh nemoci podle indikačního seznamu

Nemoci onkologické	Odborná onkologická vyšetření včetně odpovídajících laboratorních vyšetření (povinné ELFO bílkovin, RTG hrudních orgánů, podle povahy onemocnění další potřebná vyšetření). Vyšetření nesmí být starší 2 měsíců.
Nemoci ústrojí oběhového	EKG, cholesterol (případně triglyceridy). U hypertenzní choroby též oční pozadí. U obliterujících procesů cévních též funkční zkoušky námahy a zkouška polohové změny barvy na končetinách a oční pozadí. RTG hrudních orgánů (u dětí individuálně zváží navrhující lékař).
Diabetes mellitus	Glykémie, glykosurie, ketolátky, údaje o léčebných dávkách anti-diabetik, cholesterol, popř. triglyceridy, EKG, oční pozadí.
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí	Rozepsaný výdech vitální kapacity, u onemocnění horních cest dýchacích odborné vyšetření otorinolaryngologické, u alergických onemocnění alergologické vyšetření. RTG hrudních orgánů (u dětí individuálně zváží navrhující lékař, u indikací XXV/1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 není nezbytný).
Nemoci ústrojí trávicího	Příslušné RTG nebo endoskopické vyšetření, příp. chemické vyšetření žaludečních šťáv.
Nemoci jater a žlučníku	Příslušná laboratorní vyšetření, popř. RTG žlučníku, sonografie apod.
Nemoci nervové	Odborné neurologické vyšetření včetně výsledků laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též popis RTG snímků příslušné části páteře (anatomický i funkční), u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též EKG.
Nemoci pohybového ústrojí	Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření včetně popisu RTG snímků ne starších 2 let.
Nemoci ledvin a močových cest	Příslušné odborné vyšetření včetně výsledků laboratorních a ostatních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový, sedimentace erytrocytů). Dále jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny, clearance kreatininu, u lithiáz též chemické vyšetření kamenů, pokud jsou dosažitelné. U lithiáz a všech zánětlivých onemocnění též čerstvé mikrobiologické vyšetření moče a citlivost na antibiotika a chemoterapeutika.
Nemoci duševní	Odborné psychiatrické vyšetření (s přehledem dosavadního průběhu léčení).
Ostatní nemoci	Příslušná odborná vyšetření.
Poznámka	U nemocných starších 70 let komplexní interní vyšetření tam, kde lázeňské procedury představují zátěž pro kardiovaskulární systém.

Obecné kontraindikace lázeňské péče

1. Infekční nemoci přenosné na člověka a bacilonosičství, zejména břišního tyfu a paratyfu. Je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou péči, sdružená s tbc dýchacího ústrojí nebo jinou formou tbc, může být lázeňská péče navržena a povolena jen takové osobě, která již byla vyřazena z dispensárních skupin aktivní tuberkulózy.
2. Všechny nemoci v akutním stadiu.
3. Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie.
4. Stavby po hluboké tromboze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavby po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci.
5. Labilní diabetes mellitus (s výjimkou u dětí a dorostu) a dekompenzovaný diabetes mellitus.
6. Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu.
7. Kachexie všeho druhu.
8. Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjištěnými známkami pokračování nemoci.
9. Epilepsie s výjimkou případů, u nichž v posledních 3 letech nedošlo k záchvatu a jejichž EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Přetrvávají-li v EEG záznamu patologické změny, pak může být lázeňská péče navržena jen na základě kladného vyjádření neurologa, který má pacienta v dispensární péči. Pro indikační skupinu XXVI není epilepsie kontraindikací.
10. Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace, transitorní stavy zmatenosti.
11. Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách.
12. Nemocní, odkázaní na pomoc druhé osoby při sebeobsluze (s výjimkou nevidomých). Přijetí nemocného (zpravidla s průvodcem) je popř. možné po předchozím dojednání s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.
13. Inkontinence moče a stolice, enuresis nocturna. Neplatí pro indikační skupinu XXVI a indikaci XXIII/2.
14. Kouření u dorostu a u nemocných s indikacemi skupiny II, V a VI.
15. Těhotenství.
16. Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu. (Netýká se indikací skupiny X).
17. Hypertenze nad 16 kPa diastolického tlaku (-120 mm Hg).

Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé

1. Vysvětlivky, zkratky a přehled odkazů používaných v textu.

K - komplexní lázeňská péče

P - příspěvková lázeňská péče

N - zdravotní pojišťovna náklady nehradí.

Lázeňská místa, v nichž lze poskytnout komplexní lázeňskou péči, jsou vyznačena podtržením.

- 1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře zdravotní pojišťovny.
- 2) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.
- 3) Délka léčebného pobytu může být dle doporučení čs. diabetologické společnosti zkrácena, především u nemocných s diabetem I. typu.
- 4) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.
- 5) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až na 49 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.
- 6) Pouze pro stavby po poraněních a operacích periferního nervstva.
- 7) Pouze pro psoriatickou artritidu a sklerodermii s kožními projevy.
- 8) Délku léčebného pobytu je možno zkrátit v návaznosti na termín operace.

I. Nemoci onkologické

č. indikace dg.	Indikace	délka oš. doby	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
I/1 dle zákl. dg.	Onkologické případy po ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoliv známek recidivy.	21 ¹⁾	P, K	Léčbu lze poskytnout nemocným v klinické remisi. Komplexní láz. péči lze poskytnout na návrh klinického onkologa nebo jiného příslušného odborníka zpravidla 1 × do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby. Opakování léčebného pobytu je možné ve formě příspěvkové láz. péče. U nemocných s M. Hodgkin lze v indikovaných případech poskytnout komplexní láz. péči opakovaně.	Recidiva onemocnění, metastázy, nádorová kachexie.	<u>Františkovy L.</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Karlovy Vary</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>

¹⁾ Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

Lázeňská léčba je vhodná především u:

M. Hodgkin, nehodgkinské lymfomy
nádory varlat, žaludku, kolorektální nádory (anus praeter-naturalis není kontraindikací)
nádory horních cest dýchacích, hltanu a hrtanu
nádory vnitřních rodidel
nádory mammy (láz. léčba je možná i při probíhající dlouhodobé hormonální terapii).

Karlovy Vary, Luhačovice
Karlovy Vary

Karlova Studánka, Luhačovice
Františkovy Lázně
Františkovy Lázně, Karlovy Vary,
Mariánské Lázně

Vhodnost lázeňské léčby je nutno zvážit individuálně u:

mozkových a kožních nádorů, nádorů žlučníku a slinivky
břišní, sarkomů kostí a měkkých částí, nádorů štítné žlázy,
prostaty.
Pokud je u nemocného s tímto postižením shledána indikace k lázeňské léčbě, je léčení možné v
U nádorů plic (primární bronchogenní ca) lze doporučit láz. péči zpravidla až po uplynutí 1 roku od skončení komplexní léčby při trvající remisi, stejně i u nádoru ledviny (Grawitzův nádor).
O vhodnosti lázeňské léčby u chronické leukemie rozhoduje vždy hematolog.
Indikaci pro lázeňskou léčbu u ostatních méně častých nádorů stanoví klinický onkolog individuálně.

Karlovy Vary
Mariánské Lázně (nádory prostaty)

Luhačovice, Mariánské Lázně

Karlovy Vary, Mariánské Lázně

Karlovy Vary, Luhačovice

II. Nemoci oběhového ústrojí

č. indikace dg.	Indikace	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
II/1 dle zákl. dg.	Léčebně edukační pobyt pacienta s prognosticky závažnými rizikovými faktory (dyslipoproteinemie nebo kombinace dalších RF: hypertenze, diabetes mellitus přev. II. typu, obezita, hyperurikemie, genet. zátěž).	21	P, K	Komplexní láz. péče při prvním pobytu na návrh internisty nebo kardiologa. Při opakovaném pobytu nutno u obézních prokázat redukcí hmotnosti.	Negativní přístup k léčbě, kouření, neschopnost aktivního pohybu.	<u>Františkovy L.</u> <u>Jeseník</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice n. B.</u>
II/2 391, 393, 398, 422	Stav po akutní kardiitidě do 12 měsíců po vzniku.	28	K	Na návrh internisty nebo kardiologa.	Aktivita revmat. procesu, inf. endokarditida, funkční postižení NYHA III, IV.	<u>Běloves, Františkovy L.</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda, Poděbrady</u> <u>Teplice n. B.</u>
II/3 394, 395, 396, 397, 424	Vrozené a získané srdeční vady.	28	P	Na návrh internisty nebo kardiologa.	Aktivita revmat. procesu, inf. endokarditida, funkční postižení NYHA III, IV.	Běloves, Františkovy L. Konstantinovy L. Libverda, Poděbrady Teplice n. B.
II/4 412, 413, 414	Symptomatická ischemická choroba srdeční.	28	P		Síňokomorový blok II. a III. stupně, funkční postižení NYHA IV.	Běloves, Františkovy L. Jeseník Konstantinovy L. Libverda, Poděbrady Teplice n. B.
II/5 410, 412	Stav po infarktu myokardu nejpozději do 4 měsíců po vzniku (pacient po AIM s nekomplikovaným průběhem).	28 ²⁾	K	Na návrh internisty nebo kardiologa.	Síňokomorový blok II. a III. stupně funkční postižení NYHA IV.	<u>Františkovy L.</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda, Poděbrady</u> <u>Teplice n. B.</u>

²⁾ Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.

1	2	3	4	5	6	7
II/6 412	Ischemická choroba srdeční s překonaným infarktem myokardu po 4 měsících od vzniku do 12 měsíců po vzniku.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout výjimečně, na návrh internisty nebo kardiologa, nemocným, kteří ze zdravotních důvodů nemohli být léčeni dle II/5.	Síňokomorový blok II. a III. stupně, funkční postižení NYHA IV.	Běloves <u>Františkovy L.</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda, Poděbrady</u> <u>Teplice n. B.</u>
II/7 401, 402, 403, 404	Hypertenzní choroba I.–III. stupně dle SZO. Juvenilní hypertenze.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout u HCH III. st. komplikované ICHS, CMP, oblit. cév DK II. b st. nebo vaskulární nefrosklerózou na návrh internisty nebo kardiologa.	Malígní zvrát, stavy po CMP s výrazným omezením pohyblivosti nebo psychiky, klidové bolesti DK, ischemické ulcerace nebo gangréna, diabet, nefropatie s klin. nebo labor. známkami urémie, funkční postižení NYHA IV.	<u>Běloves</u> <u>Františkovy Lázně</u> Jeseník, Hodonín Karlova Studánka <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda, Poděbrady</u> Teplice, <u>Teplice n. B.</u>
II/8 440, 443, 446	Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém nebo zánětlivém ve stadiu I až II b.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh internisty u stadia II b.	Závazné projevy celkové aterosklerózy, klidové bolesti, těžké defekty.	<u>Běloves, Bělohrad</u> <u>Františkovy L., Hodonín</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda, Poděbrady</u> <u>Teplice, Teplice n. B.</u>
II/9 451, 457	Stavy po trombózách a tromboflebitídách s přetrvávajícími následky, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stadia, stavy po operaci varixů, chronický lymfatický edém.	28	P		Opakovaná plicní embolie, rozsáhlé bércové vředy, elefantiáza, recidivující erysipel.	Běloves, Františkovy L. Hodonín Konstantinovy L. Libverda, Poděbrady Teplice, Teplice n. B.
II/10 dle zákl. dg.	Funkční poruchy periferních cév.	28	P, K	Komplexní lázeňská péče se poskytuje podle § 27 odst. 5 Zdravotního řádu.		<u>Běloves, Bělohrad</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda, Luhačovice</u> <u>Poděbrady, Teplice</u> <u>Teplice n. B.</u>
II/11 394, 395, 396, 412, 413, 414, 745, 746, 747, 861	Stavy po operacích srdečních vad vrozených nebo získaných, po revaskularizačních operacích. Stavy po perkutánní transluminální angioplastice.	28 ²⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh kardiologa, kardiochirurga nebo internisty do 6 měsíců po operaci.	Síňokomorový blok III. stupně, aktivita zánětlivého procesu, infekční endokarditis, embolické komplikace, funkční postižení NYHA IV.	Běloves <u>Františkovy L.</u> <u>Konstantinovy L.</u> Libverda <u>Poděbrady</u> <u>Teplice n. B.</u>
II/12 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447	Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému.	28	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh chirurga, angiologa či kardiologa do 6 měsíců od operace.	Těžké trofické defekty, embolické komplikace.	<u>Běloves, Bělohrad</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda, Poděbrady</u> <u>Teplice</u> <u>Teplice n. B.</u>

III. Nemoci ústrojí trávicího

Obecné kontraindikace: – poruchy průchodnosti GIT a biliárního traktu s projevy stasy nad překážkou
 – zevní i vnitřní spontánně vzniklé píštěle v GIT i biliárním traktu
 – penetrace peptického vředu a stav po manifestním krvácení vředu do 1 měsíce
 – empyém žlučníku a biochemické známky cholestasy
 – jaterní nedostatečnost
 – mentální anorexie, pokud není v regresi
 – stavy vyžadující operace na GIT i bil. traktu, pokud nelze léčbu chápat jako předoperační přípravu
 pozn.: Anus praeternaturalis není kontraindikací lázeňské léčby, pouze omezuje provádění léčebných procedur.

č. indikace dg.	Indikace	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
III/1 530, 535, 536, 537	Vleklé funkční žaludeční dyspepsie též na podkladě refluxu z duodena, kardioesofageální iritace a další benigní symptomatická onemocnění jícnu (hiátové hernie, refluxní esofagitis), erosivní gastritis po eradikaci Helicobacter pylori.	21	P		Kouření, abusus alkoholu, léků.	Bílina Karlovy Vary Luhačovice
III/2 531, 532	Vředová nemoc žaludku, duodena, bulbitis s exacerbacemi i v remisi včetně vleklých dyspepsií přetrvávajících po léčbě či remisi.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh gastroenterologa při pravidelných a častých exacerbacích vedoucích k pracovní neschopnosti.	Kouření, abusus alkoholu. Exacerbace není kontraindikací léčby.	<u>Bílina</u> <u>Karlovy Vary</u> <u>Luhačovice</u>
III/3 podle zákl. dg.	Stavy po operaci žaludku, duodena a jícnu.	21 ²⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh chirurga nebo gastroenterologa do 6 měsíců po operaci.	Kouření, abusus alkoholu, léků, hrubě defektní chrup s nedostatečnou žvýkací schopností.	<u>Bílina</u> <u>Karlovy Vary</u> <u>Luhačovice</u>

1	2	3	4	5	6	7
III/4 podle zákl. dg.	Vleklé střevní poruchy s projevy maldigestce či malabsorpce, stavy po těžkých střevních infekcích a vyloučených parazitózách, dráždivý tračník. Obstipace habituální či druhotně indukovaná.	21	P	U obstipace lze lázeňskou léčbu poskytnout pouze na návrh gastroenterologa.	Abusus kodeinu a příbuzných látek.	Karlovy Vary Luhačovice
III/5 555, 556	M. Crohn, proctocolitis idiopatica.	21 ²⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh gastroenterologa, jedná-li se o těžší formy onemocnění a diagnóza je jednoznačně potvrzena.		<u>Karlovy Vary</u>
III/6 podle zákl. dg.	Stavy po resekci tenkého nebo tlustého střeva (netýká se apendektomie).	21 ²⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh chirurga do 6 měsíců po operaci.		<u>Bílina</u> <u>Karlovy Vary</u>
III/7 574, 575, 576	Chronická onemocnění žlučníku a žluč. traktu s lithiasou i bez ní, pokud operace není vhodná. Parazitózy bil. traktu (Clonorchis, Opistorchis ap.) jako součást konzervativní léčby, předoperační příprava. Funkční poruchy žlučového traktu.	21	P	Opakování léčby je vhodné k udržení remise, zvláště u osob chirurgicky vysoce rizikových (věk, krvácivé stavy, rozsáhlé nitrobrší adheze).	Neodkladná chirurgická léčba. Pokud nejde o rizikové skupiny, pak i jasně indikovaná chir. léčba, nemá-li být láz. léčba předoperační přípravou. Substenóza či litiáza žlučodů bez biochemických známek cholestázy není kontraindikací, léčba je vhodná jako předoperační příprava.	Bílina Karlovy Vary Luhačovice
III/8 podle. zákl. dg.	Stavy po operacích žlučníku a žluč. traktu, po endoskopických a jiných instrumentálních zákrocích pro stenózu a litiázu	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh chirurga, gastroenterologa nebo internisty do 6	Abusus kodeinu a příbuzných látek, obezita při přetrvávající dyspepsii (přejídání,	<u>Bílina</u> <u>Karlovy Vary</u> <u>Luhačovice</u>

1	2	3	4	5	6	7
	žlučových cest. Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.			měsíců po dissoluci kamenů, extrakorporální litotrypsii a po operacích a dalších zákrocích, pokud operaci či výkonu předcházel nebo následoval febrilní či ikterický průběh nebo akutní pankreatitis. Opakování (PLP) je vhodné, pokud přetrvává dyspepsie, jako prevence novotvorby kamenů při litogenní žluči, kde přetrvává mitigovaný zánět žlučových (i subfebrilie), zející papila Vateri či biliodigestivní anastomóza (pneumocholedochus) umožňující reflux střevního obsahu.	nedodržování životosprávy). Biochemické známky cholestázy.	
III/9 139, 571, 572, 573	Stavy po akutní hepatitidě jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékové, profesionální), chronická aktivní hepatitis s přetrváváním infekčních markerů, stav po mononukleóze s jaterním poškozením, vrozené poruchy jaterní funkce a jiné chronické jaterní choroby.	21 ²⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout do 12 měsíců po propuštění z ústavního léčení na návrh infekcionisty nebo hepatologa. Opakování je možné při přetrvávajících biochemických nebo histologických známkách jaterní poruchy.	Pokročilá jaterní nedostatečnost, stav po krvácení z jícnových varixů. Abusus alkoholu a drogová závislost. Kontraindikací není pozitivní HBsAg.	<u>Karlovy Vary</u>
III/10 577	Stavy po akutní pankreatitidě nebo po exacerbaci chronické pankreatitidy, prokázaná chronická pankreatitis,	21 ²⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh internisty nebo chirurga do 6 měsíců po akutní	Choledocholitiáza a jiné poruchy odtoku žluči a pankreat. sekretu do střeva (substenóza pap.	<u>Karlovy Vary</u>

1	2	3	4	5	6	7
	stavy po operacích a transplantacích pankreatu.			příhodě spojené s hospitalizací. Opakování je vhodné u vleklé mal digesce a malabsorpce při zjevné poruše stavu výživy (hubnutí).	Vaterovy) vyžadující chirurgickou léčbu. Abusus alkoholu, drogová závislost, jaterní insuficience.	

IV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

č. indikace dg.	Indikace	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
IV/1 250	Diabetes mellitus do 6 měs. od zjištění – edukační program.	14 ³⁾	K	Navrhuje diabetolog, opakování je případně možné po 2 letech u nemocných s předpokladem, že opakovaný pobyt pomůže zlepšit kompenzaci. Edukační program je diferencován pro I. a II. typ diabetu.	Neschopnost fyzické zátěže, nespolupracující nemocný, jiné závažné choroby.	<u>Karlovy Vary</u> <u>Luhačovice</u> <u>Poděbrady</u>
IV/2 250	Diabetes mellitus s výjimkou indikace zařazené pod IV/1.	21	P	Léčbu lze poskytnout zpravidla po 12 měs. od zjištění dg k úpravě životosprávy, posílení správných návyků, redukci hmotnosti. Navrhuje ošetřující lékař (diabetolog, internista, prakt. lékař).	Nespolupracující nemocný, komplikace diabetu.	Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně
IV/3 250	Diabetes mellitus s komplikacemi (mikro- a makroangiopatie, neuropatie). Diabetes mellitus s těžkou obtížně ovlivnitelnou obezitou.	21	P, K	Návrh podává diabetolog. Komplexní léčbu lze poskytnout 1x u počínajících komplikací nebo při jejich záchytu.	Pokročilé stadium diabet. komplikací.	<u>Karlovy Vary</u> <u>Luhačovice</u>
IV/4 278	Obezita.	21	N	Doporučenou délku léč. pobytu lze individuálně upravit.		Bílina Karlovy Vary Lipová-Lázně Luhačovice Mariánské Lázně

³⁾ Délka léčebného pobytu může být dle doporučení čs. diabetologické společnosti zkrácena, především u nemocných s diabetem I. typu.

1	2	3	4	5	6	7
IV/5 272	Hyperlipoproteinemie II. – V. typu	21	P	Případy mimo indikaci II/1.		Bílina Karlovy Vary Lipová-Lázně Luhačovice Mariánské Lázně
IV/6 242	Tyreotoxikóza.	21	P		Těžší poškození kardiovaskulárního ústrojí, maligní struma.	Jeseník Lipová-Lázně
IV/7 242	Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreotoxikózu.	21	K	Lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh endokrinologa nebo internisty do 6 měs. po operaci.	Těžší poškození kardiovaskulárního ústrojí.	<u>Jeseník</u> <u>Lipová-Lázně</u>
IV/8 227	Stavy po operaci benigního adenomu nadledvin a hypofýzy, vyvolávajícího hyperfunkční syndrom.	21	K	Lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh endokrinologa nebo internisty do 6 měs. po operaci.		<u>Jeseník</u>

V. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

U všech onemocnění je kontraindikací lázeňské léčby kouření

č. indikace dg.	Indikace	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
V/1 podle zákl. dg.	Stavy po operacích HCD a DCD (netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky).	21 ¹⁾ ⁴⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh chirurga, odborníka pro ORL nebo TRN do 6 měsíců po operaci.	Empyemy, píštěle.	<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u> Mariánské Lázně
V/2 472, 473, 474	Hypertrofické nebo atrofické záněty HCD, ozaena v soustavném odborném léčení, chronické sinusitidy a sinobronchitidy soustavně léčené.	21 ¹⁾ ⁴⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh otorinolaryngologa v případech ozaeny.	Hnisavé záněty PND vyžadující chir. léčbu, neléčený rhinosclerom.	<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u> Mariánské Lázně
V/3 476	Poškození laryngu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení (učitelé, duchovní apod.)	21 ¹⁾ ⁴⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh foniatra v případech, kdy onemocnění způsobuje opakovanou nebo dlouhodobou PN.		<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u>
V/4 477	Alergické rýmy prokázané alergolog. vyšetřením v soustavném léčení.	21	P		Hnisavé záněty PND vyžadující chir. léčbu.	Jeseník Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně
V/5 480, 486	Stavy po opakovaném nebo komplikovaném zánětu plic.	21 ¹⁾ ⁴⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh internisty nebo odborníka pro TRN především v návaznosti na hospitalisaci.		<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u> Mariánské Lázně

⁴⁾ Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.

1	2	3	4	5	6	7
V/6 491, 494	Chronická bronchitis v soustavném léčení včetně chronické mukopurulentní bronchitis a bronchiektazií.	21 ¹⁾ 4)	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh internisty nebo odborníka pro TRN, pokud hodnota VC plic nebo FEV 1 sec byla opakovaně nižší než 60 % náležité hodnoty a u bronchiektazií.		Jeseník Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně
V/7 491	Obstruktivní chronická bronchitis.	21 ¹⁾ 4)	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh internisty nebo odborníka pro TRN, pokud hodnota FEV 1 sec byla opakovaně nižší než 60 % náležité hodnoty.		Jeseník Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně
V/8 493	Astma bronchiale všech stadií i profesionální etiologie.	21 ¹⁾ 4)	P, K,	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh alergologa nebo odborníka pro TRN při frekvenci záchvatů prům. alespoň 1x měsíčně s poklesem hodnoty FEV 1 sec spontánně nebo po bronchokonstrikčním testu pod 60 % náležité hodnoty (spirometrické hodnoty nutno posuzovat ve vztahu ke klinickému stavu).		Jeseník Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně
V/9 podle zákl. dg.	Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v dlouhodobé péči včetně pneumokoniózu všech stadií.	28 ²⁾	K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh odborníka pro TRN.	U silikotuberkulózy jen u osob vyřazených z dispenzárních skupin aktivní TBC.	Jeseník Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně
V/10 podle . zákl. dg.	Následky poškození, resp. toxické účinky plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých pachů na HCD a DCD.	28 ²⁾	K	Komplexní lázeňská léčba se poskytuje podle § 27 odst. 5 Zdravotního řádu.		Jeseník Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně

VI. Nemoci nervové

Kontraindikace pro celou indikační skupinu: kouření

č. indikace dg.	Indikace	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
VI/1 342, 344, 351, 354, 355, 357	Chabé obrny mimo pouřazové včetně poinfekčních polyradikuloneuritid, postpoliomyelitický syndrom.	21 ⁵⁾	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře po odeznění akutního stadia. Opakování KLL, ne častěji než 1x za 2 roky s výjimkou prvního opakování u čerstvě vzniklého onemocnění, je možné v případech, kdy je ústavní rehabilitační pobyt nezbytný vzhledem k zhoršení klinického stavu nebo pro zpomalení progresu onemocnění. U nemocných s obrnou lícního nervu lze poskytnout léčbu jako K 1x v případě nedostačující nebo špatně dostupné ambulantní léč. rehabilitace.		Dubí <u>Janské Lázně</u> <u>Velké Losiny</u> <u>Vráž</u>
VI/2 357	Polyneuropatie s paretickými projevy.	21	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře u chabých obrn s těžším postižením, než odpovídá 3. stupni svalového testu.		Bílina <u>Dubí</u> Jáchymov <u>Janské Lázně</u> Mariánské L. Mšené Teplice <u>Velké Losiny</u> <u>Vráž</u>
VI/3 353	Kořenové syndromy vertebrogenního původu.	21	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo		Bělohrad Bílina <u>Dubí</u>

⁵⁾ Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až na 49 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

1	2	3	4	5	6	7
				rehabilitačního lékaře v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém neurologickém odd., nebo u případů nejevičích známky zlepšení po 6 týdnech ambulantní léčby, u nichž byla vyloučena indikace k neurochir. zákroku		<u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Karviná</u> Kundratice Libverda Mariánské Lázně Mšené <u>Teplice</u> <u>Treboň</u> Velichovky <u>Vráž</u>
VI/4 320, 322, 323, 324, 325, 326	Zánětlivé nemoci centrálního nervstva (stavy po meningoencefalitidách a myelitidách), pokud jsou přítomny spasticko-paretické známky.	21 ⁵⁾	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře v návaznosti na odeznění akutního stadia, opakovaná komplexní láz. léčba je možná, pokud je další ústavní rehabilitace nezbytná a povede k zlepšení zdrav. stavu.		<u>Janské Lázně</u> <u>Karviná</u> Mariánské Lázně <u>Velké Losiny</u> <u>Vráž</u>
VI/5 430, 431, 432, 433, 434, 436, 438	Hemiparézy a paraparézy cévního původu bez výraznějších psychologických změn a se známkami obnovující se funkce.	21 ⁵⁾	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilit. lékaře, a to co nejdříve po odeznění akutního stadia, opakovanou komplexní láz. léčbu lze poskytnout do 24 měs. po vzniku onemocnění pacientům se závažným postižením, u nichž lze od ústavní rehabilitace očekávat další výrazné zlepšení funkce. U každého nemocného je před posláním návrhu nutná konzultace internisty, který se vyjádří o možnosti zatížení léčebnou tělesnou výchovou z hlediska kardiovaskulárního aparátu.	Opakování náhlé cévní mozkové příhody více než dvakrát, recidiva hemiparéz do 1 roku od první ataky onemocnění, nebezpečí embolizace, těžké fatické poruchy, zejména percepční, kouření, známky kardiální insuficience.	<u>Dubí</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Karviná</u> Mšené <u>Velké Losiny</u> <u>Vráž</u>
VI/6 podle	Stavy po poraněních a operacích centrálního a periferního nervstva s	21 ⁵⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh neurologa,		<u>Bělohrad⁶⁾</u> <u>Dubí</u> <u>Janské Lázně</u>

1	2	3	4	5	6	7
zákl. dg.	poruchami hybnosti, se známkami obnovující se funkce.			neurochirurga, ortopeda nebo rehabilitačního lékaře v návaznosti na ukončení hospitalizace. Opakování komplexní láz. léčby je možné v případě, že další ústavní rehabilitace je nutná a lze od ní očekávat další zlepšení funkce.		<u>Iáchymov⁶⁾</u> <u>Karviná</u> <u>Velké Losiny</u> <u>Vráž</u>
VI/7 340, 341	Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění mimo ataku.	21	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa po první atace onemocnění a zpravidla po 2 letech od ukončení poslední láz. léčby.	Výrazná ataxie, pokročilé plegické stavy, ataky opakující se do 1 roku	<u>Dubí</u> <u>Vráž</u>
VI/8 358, 359	Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.	21 ⁵⁾	P, K	Lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh neurologa, v návrhu nutno uvést výsledek kardiologického vyšetření. Ve formě kompl. láz. léčby lze léčení poskytnout zpravidla 1x za 2 roky, v případě operací a úrazů prováze- ných delší imobilitou i častěji.	Myastenická onemocnění a paroxysmální svalové obrny. Projevy kardiální insuficience. Stavy provázené poruchami dýchání a nedostatečnou plicní ventilací.	<u>Janské Lázně</u> <u>Velké Losiny</u> <u>Vráž</u>
VI/9 336	Syringomyelie s paretickými projevy.	21	P, K	Lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh neurologa. Ve formě kompl. láz. léčby lze léčení poskytnout zpravidla 1x za 2 roky.	Poruchy dýchací a polykací.	<u>Dubí</u> <u>Vráž</u>
VI/10 343	Dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo soběstačnosti.	21	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře nemocným do 21 let. Pokud je ústavní rehabilitace nezbytná, lze komplexní láz. léčbu poskytnout i nemocným starším 21 let, nikoliv častěji než 1x za 2 roky.		<u>Dubí</u> <u>Mariánské Lázně</u> <u>Vráž</u>
VI/11 332	Parkinsonova choroba	21	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout 1x na návrh neurologa.	Netýká se parkinsonského syndromu při ateroskleróze.	<u>Dubí</u> <u>Libverda</u> <u>Mariánské Lázně</u> <u>Vráž</u>

⁶⁾ Pouze pro stavy po poraněních a operacích periferního nervstva.

VII. Nemoci pohybového ústrojí

č. indikace dg.	Indikace	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
VII/1 714	Revmatoidní artritida st. I.–IV. (včetně juvenilní artritidy).	21 ²⁾ *)	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa od II. stadia choroby s funkčním postižením třídy „b“.	Vysoká nebo narůstající aktivita, neschopnost samostatného pohybu	<u>Bechyně</u> , <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> , <u>Darkov</u> <u>Jáchymov</u> , <u>Kundratice</u> Ostrožská N. Ves Slatinice, <u>Teplice</u> <u>Toušev</u> , <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u>
VII/2 720	Ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba)	21 ²⁾ *)	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa od II. stadia choroby s funkčním postižením třídy „b“.	Vysoká nebo narůstající aktivita, těžší viscerální postižení	<u>Bechyně</u> , <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> , <u>Darkov</u> <u>Hodonín</u> , <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> , <u>Mšené</u> Ostrožská N. Ves Slatinice, <u>Teplice</u> <u>Toušev</u> , <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u>
VII/3 710, 711	Ostatní séronegativní spondartritidy (psoriatická artritida, Reiterův syndrom, enteropatické artritidy) a reaktivní (parainfekční) a druhotné artritidy.	21 ²⁾ *)	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa: a) při postižení páteře II. a vyššího stadia dle klasifikace pro ankylozující spondylitidu b) při chronické artritidě periferních kloubů od II. stadia dle klasifikace pro revmatoidní artritidu.	Vysoká nebo narůstající aktivita, těžší viscerální postižení, artritidy specifického původu.	<u>Bělohrad</u> , <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> , <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> , <u>Kundratice</u> <u>Lipová-Lázně</u> ⁷⁾ <u>Mšené</u> , <u>Teplice</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u>
VII/4 710, 713	Difúzní onemocnění pojiva s kloubními projevy (systémový lupus erythematosus, sklerodermie, polymyositis a dermatomyositis, Sjögrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).	21 ²⁾	K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout v klinické remisi na návrh revmatologa.	Vysoká nebo narůstající aktivita, závažné viscerální postižení včetně postižení CNS.	<u>Jáchymov</u> <u>Lipová-Lázně</u> ⁷⁾ <u>Teplice</u>
VII/5 713, 716	Artropatie provázející krevní, endokrinní, neurologická a plicní onemocnění (hemofilická artropatie,	21	P, K	Léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa ve spolupráci s odborníkem přísl. oboru.	Čerstvý hemartros, artritidy specifického původu, maligní proces.	<u>Bělohrad</u> <u>Darkov</u> <u>Jáchymov</u>

7) Pouze pro psoriatickou artritidu a sklerodermii s kožními projevy.

1	2	3	4	5	6	7
	diabetická artropatie, akromegalie, hypertyreóza, hypotyreóza, hypertrofická pulmonální osteoartropatie, artrózy ze snížené vnímavosti pro bolest apod.).			Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout pouze u hemofilické artropatie na doporučení hematologické poradny		Kundratice Teplice Třeboň Velichovky
VII/6 712, 713, 716	Metabolická onemocnění s postižením kloubů (dnavá artritida artikulární chondrokalcinóza, ochronotická artropatie aj.).	21	P, K	Léčbu lze poskytnout výjimečně jako komplexní na návrh revmatologa při polyartikulárních artritických změnách s dekompenzací.		Bechyně, <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> , <u>Darkov</u> <u>Jáchymov</u> Karlovy Vary <u>Kundratice</u> Mariánské Lázně Mšené, <u>Teplice</u> Toušeň, <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u>
VII/7 731	Osteoporóza primární a sekundární (především z inaktivity), zejména se svalovými paravertebrálními spazmy.	21	P	Léčbu lze poskytnout na návrh internisty nebo revmatologa.	Akutní zhoršení, stavy po čerstvých kompresivních frakturách obratlů a ostatních kostí.	Bělohrad, Jáchymov Teplice, Třeboň Velichovky
VII/8 725, 726 727, 728 729, 994	Bolestivé syndromy šlach, úponů, burz, podkožní tkáň, tuku a kosterních svalů, včetně postižení způsobených prací s vibrujícími nástroji, mimokloubní revmatismus celkový a lokalisovaný.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh ortopeda, revmatologa nebo rehabilitačního lékaře, je-li onemocnění příčinou opakované nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti.		Bechyně, <u>Bělohrad</u> Bludov, <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> , <u>Dubí</u> Františkovy L. <u>Hodonín</u> , <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> , <u>Libverda</u> Luhačovice, Mšené Ostrožská N. Ves <u>Slatinice</u> , <u>Teplice</u> Toušeň, <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> , <u>Vráž</u>
VII/9 715	Koxartróza v soustavném léčení.	21 ²⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa, ortopeda nebo rehabilitačního lékaře od III. stadia choroby s funkčním postižením třídy „b“, zcela výjimečně od II. stadia v případech rychlé progresy a častých bolestivých dekompenzací. U obézních je opakování léčby možné po prokázaném snížení hmotnosti.	Neschopnost samostatného pohybu nestabilizovaná osteonekróza.	Bechyně, <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> , <u>Darkov</u> Františkovy Lázně <u>Hodonín</u> , <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> , <u>Libverda</u> Mšené Ostrožská N. Ves <u>Slatinice</u> , <u>Teplice</u> <u>Toušeň</u> , <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u>
VII/10 715	Gonartróza v soustavném léčení.	21 ²⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa, ortopeda nebo rehabilitačního lékaře	Těžké destruktivní změny.	Bechyně, <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> , <u>Darkov</u> Františkovy L.

1	2	3	4	5	6	7
				od III. stadia choroby, zcela výjimečně od II. stadia v případech rychlé progrese nebo opakované zánětlivé iritace. U oběžných je opakování lázeňské léčby možné po prokázaném snížení hmotnosti.		<u>Hodonín, Jáchymov</u> <u>Kundratice, Libverda</u> Mšené Ostrožská N. Ves <u>Slatinice, Teplice</u> <u>Toušeň, Třeboň</u> <u>Velichovky</u>
VII/11 715	Artrózy v ostatních lokalizacích (včetně Heberdenovy polyartrózy s postižením ručních a nožních kloubů).	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout výjimečně na návrh revmatologa, ortopeda nebo rehabilitačního lékaře při rhizartróze, Heberdenových nodozitách, omartróze nebo u generalizované polyartrózy v případech, kdy onemocnění způsobuje opakovanou nebo dlouhodobou pracovní neschopnost.		Bechyně, <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč, Darkov</u> Františkovy Lázně <u>Hodonín, Jáchymov</u> <u>Kundratice, Libverda</u> Mšené Ostrožská N. Ves Slatinice, <u>Teplice</u> Toušeň, <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u>
VII/12 721, 722, 723, 724	Vertebrogenní syndrom algický funkčního nebo degenerativního původu, soustavně léčený.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout výjimečně, na návrh rehabilitačního lékaře, je-li vertebrogenní syndrom příčinou opakované pracovní neschopnosti.	Kompresivní radikulární syndrom.	Bílina, Bludov Bechyně, <u>Bělohrad</u> Bohdaneč, <u>Darkov</u> Dubí Františkovy Lázně <u>Hodonín, Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> Karlovy Vary <u>Libverda, Luhačovice</u> Mariánské Lázně <u>Mšené</u> Ostrožská N. Ves Slatinice, <u>Teplice</u> Toušeň, <u>Třeboň</u> <u>Velichovky, Vráž</u>
VII/13 737	Skoliózy idiopatické a jiné s tíží zakřivení do 60° dle Cobba, soustavně léčené.	21 ¹⁾ ⁴⁾	P, K	Léčbu lze poskytnout jako komplexní na návrh ortopeda nebo rehabilitačního lékaře nemocným do 25 let s tíží zakřivení od 20° dle Cobba.		<u>Bělohrad</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Karviná</u> <u>Mariánské Lázně</u> <u>Vráž</u>
VII/14 dle zákl. dg.	Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního.	21 ¹⁾ ⁴⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh ortopeda, neurochirurga, neurologa nebo rehabilitačního lékaře do 1 roku po závažných úrazech a operacích	Nezhojené rány. Přijetí nemocného odkázaného na pomoc druhé osoby při sebeobsluze je nutné předem projednat s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.	<u>Bělohrad, Bludov</u> <u>Bohdaneč, Darkov</u> <u>Dubí, Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Janské Lázně</u>

1	2	3	4	5	6	7
				s významným omezením hybnosti nebo narušením pohybového stereotypu.		<u>Karviná, Libverda</u> <u>Mariánské Lázně</u> <u>Mšené, Teplice</u> <u>Třeboň, Velichovky</u> <u>Vráž</u>
VII/15 dle zákl. dg.	Stavy po ortopedických operacích s použitím náhrady kloubní.	21 ¹⁾ ⁴⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh ortopeda, revmatologa nebo rehabilitačního lékaře do 1 roku po operaci.	Nezhojené rány. Přijetí nemocného odkázaného na pomoc druhé osoby při sebeobsluze je nutné předem projednat s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.	<u>Bělohrad, Bohdaneč</u> <u>Jáchymov</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Karviná, Teplice</u> <u>Třeboň, Velichovky</u> <u>Vráž</u>
VII/16 dle zákl. dg.	Předoperační příprava před plánovanou náhradou kloubní.	21 ⁸⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení specialisty-ortopeda, je-li nezbytně nutná v rámci přípravy k operačnímu výkonu.		<u>Bělohrad, Bohdaneč</u> <u>Jáchymov</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Karviná, Teplice</u> <u>Třeboň, Velichovky</u> <u>Vráž</u>

⁸⁾ Délku léčebného pobytu je možno zkrátit v návaznosti na termín operace.

VIII. Nemoci ústrojí močového

Kontraindikace pro celou skupinu VIII: chronická glomerulonefritis, stavy spojené s městnáním moči pro překážku v močových cestách a rezidua v měchýři více než 30 ml, průvodná hypertenze nad 16 kPa diastol. tlaku (120mm Hg) hodnota kreatininu v séru nad 200 mikromolů, píštěle v operační ráně.

č. indikace dg.	Indikace	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
VIII/1 590, 593 595, 753	Netuberkulózní chronické záněty cest močových, chronická pyelonefritida.	21	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh urologa nebo internisty u chronické pyelonefritidy v solitární ledvině nebo při cystickém onemocnění ledvin.		<u>Mariánské Lázně</u>
VIII/2 592	Nefrolitiáza bez prokazatelného městnání v močových cestách, nefrokalcinóza.	21	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh urologa nebo internisty při nefrolitiáze v solitární ledvině nebo při oboustranné nefrolitiáze, pokud tyto stavy nejsou indikovány k operační léčbě, dále u cystinové nefrolitiázy a bilat. nefrokalcinózy.		<u>Mariánské Lázně</u>
VIII/3 podle zákl. dg.	Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovesikálních, stavů po prostatektomii a nefrolitotrypsii (netrolitolapaxii).	21	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh urologa do 6 měs. (alt. 12 měs.) od výkonu jako doléčení po LERV a po operacích s výjimkou stavů po prostatektomii a endovesikální laváži.		<u>Mariánské Lázně</u>
VIII/4 597, 601	Prostatitida, prostatovesikulitida, chronická uretritida.	21	P			Mariánské Lázně

IX. Duševní poruchy

č. indikace dg.	Indikace	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
IX/1 295, 296, 297	Psychózy v stadiu remise.	21 ⁴⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh psychiatra v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém odd. nebo v případě ohrožení pracovní schopnosti při trvalé ambulantní léčbě.	Veškeré demence a poruchy vědomí. Neschopnost dodržovat léčebný řád.	<u>Dubí</u> <u>Jeseník</u>
IX/2 300, 306, 307, 309, 310, 311, 316	Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy včetně poruch psychosomatických.	21 ⁴⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh psychiatra v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém odd. nebo v případě ohrožení pracovní schopnosti při trvalé ambulantní léčbě.	Veškeré demence a poruchy vědomí. Neschopnost dodržovat léčebný řád.	<u>Dubí</u> <u>Jeseník</u> Libverda Vráž

X. Nemoci kožní

č. indikace dg.	Indikace	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
X/1 691	Atopický ekzém.	28 ²⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh dermatologa, pokud lázeňská léčba bezprostředně navazuje na hospitalizaci, nebo je její alternativou.		<u>Jeseník</u> <u>Lipová-Lázně</u>
X/2 696	Psoriasis vulgaris.	28	P			Lipová-Lázně
X/3 696	Psoriasis generalisata et arthropatica.	28 ²⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh dermatologa v případě, že lázeňská léčba bezprostředně navazuje na hospitalizaci nebo ambulantní léčbu pro akutní exacerbaci. U artropatické psoriázy i na návrh revmatologa.		<u>Lipová-Lázně</u>
X/4 706	Acne conglobata et indurata.	28	P			Lipová-Lázně
X/5 dle zákl. dg.	Chronické dermatózy.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout výjimečně, na návrh dermatologa, v případě, že láz. léčba je pokračováním nebo alternativou hospitalizace.		<u>Lipová-Lázně</u>
X/6 dle zákl. dg.	Toxické kontaktní dermatitidy a ekzém profesionálního původu v soustavném odborném léčení.	28 ²⁾	P, K	Komplexní lázeňská péče se poskytuje podle § 27 odst. 5 Zdravotního řádu.		<u>Lipová-Lázně</u>
X/7 941, 942, 943, 944, 945, 946	Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné smršťování jizev, do 6 měsíců od zhojení.	28 ¹⁾	K	Léčbu lze poskytnout na návrh chirurga, plastického chirurga nebo rehabilitačního lékaře.		<u>Bělohrad</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Karviná</u> <u>Lipová-Lázně</u>

XI. Nemoci ženské

č. indikace dg.	Indikace	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
XI/1 628	Sterilita a infertilita (primární a sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním, Abortus habitualis).	28	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout u žen do 40 let věku celkem 2x. U sterility je nutné i vyšetření partnera, a jde-li o ženu starší 35 let, genetické vyšetření obou partnerů.		<u>Františkovy Lázně</u>
XI/2 256, 621 626	Poruchy ovariální funkce a vývoje dělohy (hypoplasia uteri, oligohypomenorrhoe, cyclus anovularius, insufficientia ovarialis, deviatio uteri).	28	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout celkem 2x.		<u>Františkovy Lázně</u>
XI/3 614, 615, 616	Zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (zánětlivé komplikace po umělém přerušení těhotenství, kolpitis chronica, endocervicitis chronica, endomyometritis chronica, oclusio tubarum, parametritis chronica, adhesiones organorum pelvis minoris).	28	P, K	Lázeňskou léčbu je možno poskytnout po akutní exacerbaci zánětlivého onemocnění opakovaně, u žen ve fertilním věku jako komplexní.		<u>Františkovy Lázně</u>
XI/4 dle zákl. dg.	Stavy po gynekologických operacích a po operacích v oblasti malé pánve.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout do 12 měs. od operace, a to po operacích, které byly komplikované nebo s komplikovaným pooperačním průběhem, a dále u žen do 30 let po břišních operacích se vztahem ke krajíně malé pánve.		<u>Františkovy Lázně</u>
XI/5 625, 626, 627	Funkční poruchy (klimakterický syndrom, dyspareunie, algopareunie, frigidita dysmenorrhoe, algomenorrhoe, pelvipathia spastica).	28	P			Františkovy Lázně Jeseník Teplice n. B.

Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost

1. Přehled dětských lázeňských léčeben s určením pro věkovou kategorii:

Bělohrad	pro děti od 6 let a dorost
Bludov	pro děti od 3 let a dorost
Darkov	pro děti od 3 do 15 let
Františkovy Lázně	pro děti od 5 let a dorost
Janské Lázně	pro děti od 2 let a dorost. U indikací skupin XXVI a XXVII je možná léčba dětí od 1 roku po předchozí dohodě s vedoucím lékařem lázeňské léčebny
Jeseník	u indikací skupiny XXV a indikace XXX/2 pro děti od 6 let a dorost, léčba dětí mladších 6 let je možná pouze v doprovodu rodičů. Indikace skupiny XXIX jsou určeny pouze pro léčbu dorostu
Karlovy Vary	pro děti od 3 let a dorost
Kynžvart	pro děti od 2 do 15 let
Luhačovice	u indikací skupiny XXV pro děti od 5 let a dorost, u indikací skupiny XXIV pro děti od 10 let a dorost
Mariánské Lázně	u indikací skupiny XXV a indikace XXVII/4 pouze pro dorost, u indikací XXVIII pro děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Poděbrady	pro děti od 3 let a dorost
Teplice nad Bečvou	pro děti od 3 let a dorost
Teplice v Č.	pro děti od 3 let a dorost, léčba dětí od 2 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Velké Losiny	u indikací skupiny XXV pro děti od 3 do 15 let u indikací skupiny XXVI pro děti od 1 roku do 15 let
Železnice	pro děti od 3 let a dorost

2. Obecná ustanovení

Délka léčebného pobytu dětí a dorostu se řídí zdravotním stavem nemocných a rozhoduje o ní vedoucí lékař lázeňské léčebny.

Dorostu lze výjimečně a se souhlasem rodičů poskytnout lázeňskou péči i v léčebnách pro dospělé.

Pobyt průvodce se považuje za ústavní ošetřování (§ 24 odst. 3 Zdravotního řádu), pouze pokud je dle ošetřujícího lékaře nezbytné zaškolení průvodce dítěte navrženého na lázeňskou léčbu pro indikace XXI/1, XXVI/3 a do Karlových Varů pro indikaci XXIV/1.

3. Indikační skupiny

XXI. Onkologická onemocnění

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXI/1 (podle zákl. dg.)	Onkologická onemocnění do 24 měsíců od ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoli známek recidivy a metastáz. Návrh vystavuje klinika dětské onkologie FN Praha 5-Motol a oddělení dětské onkologie FN s poliklinikou v Brně, příp. jiné odborné onkolog. pracoviště.	Janské Lázně	

XXII. Nemoci oběhového ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu XXII: aktivita zánětlivých procesů, bakteriální endokarditis, klidová nebo noční dušnost, známky městnání ve velkém oběhu, bloky III. stupně se stavy bezvědomí v anamnéze. Indikace XXII/10 je určena pouze pro lázeňskou léčbu dorostu.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXII/1 (390, 391, 392)	Stavy po revmatické horečce od 6 do 12 měsíců po vymizení aktivity.	Poděbrady Teplice n. B.	
XXII/2 (422)	Stavy po akutní karditidě nerevmatické para či postinfekční od 6 do 12 měsíců po vymizení aktivity.	Poděbrady Teplice n. B.	
XXII/3 (393, 424, 425)	Chronické karditidy.	Poděbrady Teplice n. B.	
XXII/4 (746, 747)	Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév před operací.	Poděbrady Teplice n. B.	
XXII/5 (dle zákl. dg.)	Stavy po operacích vrozených nebo získaných vad oběhového ústrojí.	Poděbrady Teplice n. B.	
XXII/6 (390, 710)	Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy.	Poděbrady Teplice n. B.	
XXII/7 (306)	Neurocirkulační asthenie závažné symptomatologie.	Poděbrady Teplice n. B.	
XXII/8 (401, 402, 403, 404)	Juvenilní hypertenze.	Poděbrady Teplice n. B.	

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXII/9 (dle zákl. dg.)	Nemoci periferních cév.	Poděbrady	
XXII/10 (dle zákl. dg.)	Léčebně edukační pobyt pacienta s prognosticky závažnými rizikovými faktory.	Poděbrady Teplíce n. B.	

XXIII. Nemoci ústrojí trávicího

Kontraindikace pro celou skupinu XXIII: těžší poruchy výživy, těžká anémie (Hb 100 g/l a méně).

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXIII/1 (dle zákl. dg.)	Chronické onemocnění žaludku, funkční poruchy žaludku, chronická gastritis a duodenitis erosiva, vředová choroba žaludku a dvanáctníku, stavy po operacích žaludku a dvanáctníku.	Karlovy Vary	Stenózy a penetrace, případy vyžadující reoperaci
XXIII/2 (dle zákl. dg.)	Chronické onemocnění střev, funkční poruchy tenkého a tlustého střeva, chron. enterokolitidy včetně M. Crohn a ostatní primární malabsorpční syndromy, dermatogenní malabsorpční syndromy, polyposis intestini, megacolon vrozené i získané, stavy po operacích na tenkém i tlustém střevě.	Karlovy Vary	Chronická parazitární a bacilární onemocnění střev
XXIII/3 (dle zákl. dg.)	Nemoci jater, stavy po infekční hepatitidě, chron. hepatitidy, cirhózy ve stavu kompenzace, toxická poškození jater, stavy po inf. mononukleóze s jaterní poruchou, stavy po úrazech a operacích jater a jiné hepatopatie.	Karlovy Vary	Pokročilá jaterní nedostatečnost
XXIII/4 (574, 575, 576)	Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest, vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece, chron. cholecystitidy, biliární dyspepsie, stavy po operacích žlučníku a žluč. cest.	Karlovy Vary	Obstrukce nebo infekce žlučových cest, empyem žlučníku, cholangitis
XXIII/5 (577)	Chronické nemoci pankreatu, stavy po akutní pankreatitis, chron. pankreatitis, pankreatická achylie vrozená i získaná, mukoviscidosa, stavy po operacích a úrazech pankreatu.	Karlovy Vary	Časté exacerbace pankreatitidy

XXIV. Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXIV/1 (250)	Diabetes mellitus.	Karlovy Vary Luhačovice	Nestabilizovaný diabetes
XXIV/2 (272, 278)	Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita u spolupracujících pacientů.	Bludov Karlovy Vary Luhačovice Poděbrady	
XXIV/3 (272)	Hyperlipoproteinemie.	Karlovy Vary Poděbrady	
XXIV/4 (242)	Tyreotoxikóza.	Jeseník	
XXIV/5 (242)	Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreotoxikózu.	Jeseník	

XXV. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu XXV: kardiorespirační nedostatečnost, anatomické překážky v dýchacích cestách. Pro léčbu v Luhačovicích a Kynžvartu nejsou bronchiektazie kontraindikací.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXV/1 (472, 474, 476, 478)	Recidivující katary horních cest dýchacích s oslabenou odolností.	Bludov Janské Lázně Jeseník Kynžvart Mariánské Lázně Luhačovice Velké Losiny	
XXV/2 (508)	Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením.	Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny	
XXV/3 (490, 491)	Bronchitis recidivans.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny	Bronchiektazie
XXV/4 (473, 490, 491)	Sinobronchitis.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny	Bronchiektazie

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXV/5 (480, 487)	Rekonvalescence po zánětu plic opakovaném v průběhu posledních 2 let.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny	Bronchiektazie
XXV/6 (491)	Bronchitis asthmatica, spastica a obstructiva.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny	
XXV/7 (493)	Asthma bronchiale.	Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny	Bronchiektazie
XXV/8 (519)	Dermorespirační syndrom.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny	Bronchiektazie
XXV/9 (dle zákl. dg.)	Stavy po operacích horních a dolních cest dýchacích a plic.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny	Bronchiektazie
XXV/10 (dle zákl. dg.)	Intersticiální plicní fibróza.	Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny	
XXV/11 (dle zákl. dg.)	Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny	

XXVI. Nemoci nervové

Kontraindikace pro celou skupinu XXVI: vážnější psychické poruchy, kožní defekty, stavy neovlivnitelné rehabilitací.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXVI/1 (dle zákl. dg.)	Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie (chabé obrny). Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stadia nebo po operaci.	Janské Lázně Velké Losiny	
XXVI/2 (359)	Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.	Janské Lázně Teplice Velké Losiny	Imobilní pacienti s rychlou progresivitou nemoci
XXVI/3 (343, 348, 349)	Dětská mozková obrna a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení).	Janské Lázně Teplice Velké Losiny Železnice	Mentální retardace znemožňující spolupráci při léč. rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní léčby
XXVI/4 (dle zákl. dg.)	Jiné hybné poruchy centrálního původu: hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná léč. rehabilitací, hybné poruchy po cévních příhodách mozkových, hybné poruchy po úrazech mozku, hybné poruchy po operacích benigních nádorů CNS. Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stadia nebo po operaci.	Janské Lázně Teplice Velké Losiny Železnice	Mentální retardace znemožňující spolupráci při léčebné rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní léčby
XXVI/5 (353)	Kořenové syndromy vertebrogenního původu.	Bělohrad Janské Lázně Teplice	

XXVII. Nemoci pohybového ústrojí

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXVII/1 (713, 714)	Juvenilní chronická artritida a jiná chronická onemocnění kloubů a páteře. Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka.	Bělohrad Poděbrady Teplice Teplice n. B.	Výrazné oběhové poruchy
XXVII/2 (754, 755, 756)	Vrozené ortopedické vady pohybového aparátu.	Bělohrad Janské Lázně Teplice	
XXVII/3 (dle zákl. dg.)	Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí do 36 měsíců po úrazu nebo operaci.	Bělohrad Janské Lázně Poděbrady Teplice	

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXVII/4 (737)	Skoliózy – mobilní ve stálé rehabilitační péči.	Bělohrad Darkov Janské Lázně Mariánské Lázně Teplíce	
XXVII/5 (732)	Osteochondrózy ve stadiu reparačním. Morbus Perthes ve stadiu reparačním.	Darkov Teplíce	
XXVII/6 (732)	Morbus Scheuermann.	Bělohrad Darkov Teplíce	
XXVII/7 (730)	Vleklé osteomyelitidy.	Darkov Teplíce	Stavy s pěstějí
XXVII/8 (721, 722, 723, 724, 732)	Vertebrogenní syndrom algický funkčního či degenerativního původu.	Bělohrad Bludov Janské Lázně Teplíce	

XXVIII. Nemoci ledvin a cest močových

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXVIII/1 (590, 595, 597)	Recidivující nebo vleklé netuberkulózní záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomické nebo funkční léze.	Bludov Mariánské Lázně	Známky ledvinné nedostatečnosti s kreatininemií nad 150 μmol . diastol. hypertenze nad 100 mm Hg
XXVIII/2 (592, 594)	Urolitiáza – po operaci nebo spontánním odchodu konkrementu – s konkrementem in situ, neoperabilní stavy, – recidivující formy sui generis nebo metabolicky podmíněné. Pozn.: dle možností sdělit chemické složení konkrementu.	Mariánské Lázně	Lokalizace konkrementu s nebezpečím kompletní blokády močových cest
XXVIII/3 (dle zákl. dg.)	Stavy po operacích močového ústrojí (mimo urolitiázu) – do 12 měsíců po výkonu, – do 3 let po výkonu, pokud jsou komplikovány infekčním zánětem.	Bludov Mariánské Lázně	Operační rána s pěstějí vyžadující trvalé chirurgické ošetřování, stavy vyžadující trvalé používání urinalu nebo opakované cévkování
XXVIII/4 (581, 582, 583)	Vleklá difusní onemocnění ledviných klubiček (glomerulonefritis, lipoidní nefróza, hereditární nefropatie) pouze v klidovém stadiu bez sklonu ke klinickým recidivám a bez potřeby medikamentózní terapie ve vysokých dávkách.	Mariánské Lázně	Vysoká a nevyrovnaná aktivita onemocnění, sklon k iontové a vodní disbalanci, FW vyšší než 50 mm/hod., kreatininemie nad 150 μmol . diastol. hypertenze nad 100 mm Hg

XXIX. Duševní poruchy

Určeno pouze pro lázeňskou léčbu dorostu

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXIX/1 (295,296, 297)	Psychózy ve stadiu remise.	Jeseník	Poruchy vědomí, neschopnost dodržovat léčebný řád
XXIX/2 (300, 306, 307, 309, 310, 311, 316)	Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy	Jeseník	Poruchy vědomí, neschopnost dodržovat léčebný řád

XXX. Nemoci kožní

Kontraindikace pro celou skupinu XXX: mikrobiální ekzém. Dorostu lze lázeňskou léčbu poskytnout i v léčebně Lipová.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXX/1 (696)	Psoriasis – chronické a recidivující formy.	Darkov Kynžvart Teplíce n. B.	
XXX/2 (691, 692)	Chronické a recidivující ekzémy, včetně atopického, chronické prurigo.	Darkov Jeseník Kynžvart Teplíce n. B.	Impetiginizace, mikrobiální ekzémy
XXX/3 (706)	Indurativní a konglobující formy akne.	Darkov	
XXX/4 (701)	Sklerodermie.	Darkov	Maligní a progredující formy
XXX/5 (701, 757)	Ichtyózy.	Darkov Kynžvart Teplíce n. B.	
XXX/6 (dle zákl. dg.)	Chronické dermatózy.	Darkov Kynžvart Teplíce n. B.	
XXX/7 (dle zákl. dg.)	Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.	Bělohrad Janské Lázně	

XXXI. Nemoci gynekologické

Kontraindikace pro celou skupinu XXXI: appendicitis chronica.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXXI/1 (614, 615, (616)	Zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel.	Františkovy Lázně	
XXXI/2 (621, 629)	Hypoplazie vnitřních rodidel a retrodeviace dělohy.	Františkovy Lázně	
XXXI/3 (259, 626, 629)	Primární dysmenorea, primární amenorea s nadměrným růstem nebo při zavedení umělého cyklu k zástavě růstu, sekundární amenorea u mentálních anorexií po velkém zhubnutí, hypoestrinní hypo-oligo-menorea.	Františkovy Lázně	
XXXI/4 (256, 626)	Stavy po léčených juvenilních metro-ragiích hypohormonálních nebo zánětlivých.	Františkovy Lázně	Hyperestrogenní stavy.
XXXI/5 (dle zákl. dg.)	Sekundární poruchy cyklu po infekčních chorobách s postižením rodidel.	Františkovy Lázně	
XXXI/6 (dle zákl. dg.)	Stavy po operacích vnitřních rodidel a po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve, zejména po appendectomii do 6 měsíců od operace.	Františkovy Lázně	