


## SKLADIŠTNÍ ŠKŮDCI


Červotoč spízní	– Stegobium paniceum
Kornatec skladištní	– Tenebroides mauritanicus
Korovník obilní	– Rhyzopertha dominica
Lesák skladištní	– Oryzaephilus surinamensis
Lesák moučný	– Cryptolestes ferrugineus
Pilous černý	– Sitophilus granarius
Pilous rýžový	– Sitophilus oryzae
Pisivka	– Liposcelis corrodens
Potemník hnědý	– Tribolium castaneum
Potemník skladištní	– Tribolium confusum
Potemník moučný	– Tenebrio molitor
Roztoč moučný	– Acarus siro
Roztoč ničivý	– Glycyphagus destructor
Roztoč dravý	– Cheyletus eruditus (pokud nebyl prokazatelně použit pro biologické hubení roztoče moučného nebo roztoče ničivého)
Vrtavec zhoubný	– Ptinus fur
Zavíječ moučný	– Ephestia Kühniella
Zavíječ paprikový	– Plodia interpunctella
Zavíječ skladištní	– Ephestia elutella

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 194/1996 Sb.


## SKLADIŠTNÍ ŠKŮDCI




**Vrtavec zhoubný** (*Ptinus fur* , vel. 2 - 4,3 mm)




**Červotoč spížní** (*Stegobium paniceum*, vel. 2,2 - 3,7 mm)




**Kornatec skladištní (*Tenebroides mauritanicus*, vel. 5 – 11 mm)**




**Potemník moučný (*Tenebrio molitor*, vel. 13,5 - 18,5 mm)**




**Pilous rýžový** (*Sitophilus oryzae*, vel. 2,5 - 4 mm)




**Pilous černý** (*Sitophilus granarius*, vel. 3 - 4,5 mm)

**Zavíječ paprikový (Plodia interpunctella)**


housenka (vel. 10 - 15 mm)




dospělec (vel. 14 - 19 mm)




**Potemník skladištní** (*Tribolium confusum*, vel. 2,9 - 4,4 mm)




**Potemník hnědý** (*Tribolium castaneum*, vel. 2,8 - 4,2 mm)



**Pisivka** (*Liposcelis corrodens* , vel. 0,75 - 1,2 mm)




**Lesák moučný** (*Cryptolestes ferrugineus* , vel. 1,5 - 2,5 mm)



**Korovník obilní** (*Rhyzopertha dominica*, vel. 2 - 3 mm )





**Lesák skladištní** (*Oryzaephilus surinamensis* , vel. 1,8 - 3,5 mm )